

# Nyhet!

-nu receptfritt på apoteket

## Loceryl® amorolfin.



Medicinskt nagellack för  
behandling av nagelsvamp

**GALDERMA**  
Committed to the future  
of dermatology



## Nagelsvamp

Nagelsvamp är ett vanligt besvär. Cirka fem procent av befolkningen i Sverige är drabbad av nagelsvamp. Nagelsvamp kan orsakas av tre olika typer av svampar: trådsvampar (kallas också dermatofyter), jästsvampar eller mögelsvampar. Den första typen, dermatofyterna, är den klart vanligaste orsaken till nagelsvamp. Svampen lever av keratin, som finns i hud- och nagelvävnad.

## Symptom

Svampen växer långsamt och ger ofta bara lätta symptom i början. Efterhand blir nageln missfärgad, förtjockad och spricker eller skivar sig. Oftast är det naglarna på fötterna som drabbas. Vanligen angriper svampen först huden på fötterna, särskilt mellan tårna, för att sedan sprida sig till tånaglarna.



## Loceryl (amorolfin)

Loceryl är ett medicinskt nagellack för behandling av nagelsvamp.

- Innehåller amorolfin som påverkar bildningen av nya svampsporer.
- Lokal behandling som har effekt på flera olika svamparter.
- Tränger ned genom nageln och kan därmed angripa svampsporererna.

### Så här används Loceryl:

- Loceryl nagellack strykes på de angripna naglarna 1 gång i veckan
- Appliceras varje vecka under flera månader
- Behandlingen skall fortsätta tills de sjuka naglarna är helt utväxta
- Det tar normalt upp till 6 månader för fingernaglar och 9–12 månader för tånaglar att växa ut

3 ml Loceryl räcker:

- Ca 3–4 månader till 3–4 fingernaglar
- Ca 6 månader för 1–2 tånaglar

Loceryl finns receptfritt på apoteket.



## Goda råd till patienten

- Tvätta fötterna grundligt med tvål och torka dem noggrant –glöm ej att torka mellan tårna.
- Byt strumpor varje dag.
- Bomullsstrumpor skall tvättas i 60 C° för att döda svampsporererna.
- Undvik för små skor eller täta skor av syntetmaterial.
- Använd badskor i offentliga simhallar/gym.
- Undvik att utsätta naglarna för tryck eller andra former av skador.
- Gummihandskar vid disk och handtvätt är ett enkelt sätt att skydda naglarna på.

**Vad Loceryl är och vad det används för:** Loceryl innehåller amorolfin, som har effekt på ett flertal svamparter som kan orsaka nagelinfektioner. Amorolfin tränger ned genom nageln och kan därigenom bekämpa svåråtkomliga svampar i nagelbädden. Loceryl används för behandling av måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon. Receptfritt kan Loceryl användas när du tidigare har fått diagnos och behandling av läkare och är i behov av ytterligare behandling. Du kan också behöva påbörja en ny behandling om infektionen återkommer. **Innan du använder Loceryl:** Använd inte Loceryl om du är allergisk (överkänslig) mot amorolfin eller något av övriga innehållsämnen i Loceryl. **Var särskilt försiktig med Loceryl** om du kommer i kontakt med lösningsmedel (thinner, lacknafta, aceton m fl). Då bör skyddshandskar användas för att skydda Loceryl lacket på naglarna. Kosmetiskt nagellack eller lösnaglar skall ej användas under behandling med Loceryl. Nagelfilar som har använts till angräpnaglar får ej användas på friska naglar. Barn bör ej behandlas med Loceryl eftersom erfarenhet saknas. **Användning av andra läkemedel:** Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. **Graviditet och amning:** Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Begränsad erfarenhet av användning under graviditet och amning. **Rådgör** därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Loceryl under graviditet eller amning. **Om du använt för stor mängd av Loceryl:** Enstaka fall av nagelskador (framförallt missfärgning) har rapporterats. Om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. **Om du har glömt att använda Loceryl:** Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. **Eventuella biverkningar:** Liksom alla läkemedel kan Loceryl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar är sällsynta. Nagelskador (t ex missfärgning av naglar, brutna naglar, sköra naglar) kan förekomma. Dessa reaktioner kan dock även bero på själva nagelsvampsjukdomen. Sällsynta (fler eller lika med 1 patient av 10 000, men färre eller lika med 1 patient av 1000): Nagelskada, missfärgning av naglar och sköra naglar. Mycket sällsynta (färre eller lika med 1 patient av 10 000): Brännande känsla i huden. Biverkningar med ökad frekvens: Kontaktexem. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. **Förpackningstyp och innehåll:** 5 ml glasflaska (receptbelagd). 3 ml glasflaska (receptfri, ingår ej i förmånssystemet). **Pris:** 3 ml 356 kr, 5 ml 353 kr. **Informationen baserad på produktresumé godkänd:** 2009-05-29. För fullständig information läs bipacksedeln eller se [www.fass.se](http://www.fass.se).