



## Fakta:

### Hvad sker der efter behandling med dagslys-PDT?

Efter behandlingen bliver huden rød, og efter en til flere dage kan der danne sig blærer og sår. Ved behov kan sårene beskyttes med løst plaster. Huden kan også svulme op. Derefter heler området ved, at der dannes sårskorpe. Sårhelingen tager ca. 1–2 uger i alt. Derefter forsvinder den røde farve lidt efter lidt.

Det behandlede område bør beskyttes mod sollys på behandlingsdagen og de næstfølgende dage (48 timer). Du kan også bruge en blødgørende creme, hvis huden føles tør. Rengøring sker bedst udelukkende med vand eller eventuelt et mildt rensprodukt. Fotodynamisk terapi med Metvix giver som oftest et meget godt kosmetisk resultat.

Da det er solen som er skyld i skaderne i huden, er det en god idé at beskytte huden mod sollys i fremtiden. Brug beskyttende tøj og solbeskyttelse med en høj faktor størstedelen af året.

Aktiniske keratoser er en kronisk hudforandring, og der er derfor stort behov for at opdage skaderne i tide, behandle effektivt og forbygge udvikling af nye skader. Din hud bør undersøges regelmæssigt af en læge, der vurderer, om der er behov for nye behandlinger.