

Suojaudu vaarallisilta auringonsäteiltä!

Actinica® Lotion suojaa ihoa UV-säteilyltä
ja ehkäisee tiettyjä ihosyöpätyyppejä
riskiryhmään kuuluvilla henkilöillä*



*Potilaat, joiden immuunipuolustus on heikentynyt (elinsiirron saaneet)

**Actinica Lotion -voidetta voi ostaa
ihotautiklinikoilta, apteekeista ja verkkoapteekeista**

GALDERMA

Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala
Tel 018-444 03 30 www.galderma.se

Pitkäaikainen altistuminen UV-säteilylle on yksi ihosyövän (muun kuin melanooman) kehittymiseen vaikuttavista syistä

Monet tekijät voivat suurentaa auringon aiheuttamien vaurioiden ja muiden ihosyöpätyyppien kuin melanooman riskiä. Suurentuneen riskin syitä voivat olla:

- Aiemmin sairastettu ihosyöpä tai aiemmin todetut aktiiviset keratoosit
- Heikentynyt immuunipuolustus, joka johtuu:
 - immuunipuolustusta heikentävän lääkkeen käytöstä elinsiirron jälkeen tai jonkin muun sairauden vuoksi
 - immuunijärjestelmän toimintaan vaikuttavasta sairaudesta
- Pitkäaikainen altistuminen auringonvalolle esimerkiksi ulkotöissä.



Faktatietoa: Aktiiniset keratoosit

Aktiininen keratoosi on levyepiteelisyövän esiaste. Kyseessä on ihosolujen häiriö, joka aiheutuu pitkäaikaisesta altistumisesta ultraviolettivalolle (UV-valolle).

Muutoksia esiintyy ennen kaikkea auringonvalolle altistuneilla ihoalueilla, ja yleensä ne ovat punaisia, karheita ja hilseileviä läiskiä. Tyypillisesti aktiinisia keratooseja on aluksi vain muutamia, mutta vuosien myötä niitä voi kehittyä runsaasti samalla ihoalueelle.

Aktiiniset keratoosit voivat aiheuttaa kutinaa ja ärsytystä ja joskus myös haavaumia.



Lähikuva otsasta, jossa on useita aktiinisia keratooseja ja auringon aiheuttamia ihovaurioita.

Aktiinisten keratoosien hoito

Aktiiniset keratoosit ovat usein vaarattomia, mutta joissakin tapauksissa ne saattavat kehittyä ihosyövän vakavammaksi muodoksi, levyepiteelisyöväksi. On mahdotonta ennustaa, mitkä aktiinisista keratooseista kehittyvät levyepiteelisyöväksi, ja siksi on tärkeää hoitaa kaikki ihomuutokset ajoissa.

Aktiinisiin keratooseihin ja muihin auringon aiheuttamiin vaurioihin on monia hoitokeinoja:

- reseptillä saatavat lääkevoiteet, joita käytetään kotona muutaman viikon ajan.
- fotodynaaminen hoito (PDT), joka toteutetaan kontrolloidussa ympäristössä ihotautilääkärin vastaanotolla.

ACTINICA® LOTION

Aurinkosuoja, joka ehkäisee tiettyjä ihosyöpätyyppejä
riskiryhmään kuuluvilla henkilöillä*

- Actinica Lotion -voidepullon annostelupumpun ansiosta saat jokaisella pumpun painalluksella yhtä paljon aurinkovoidetta.
- Katso annosteluohjeet pullon etiketin kääntöpuolelta. Niitä noudattamalla varmistat, että käytät riittävän määrän voidetta suojataksesi ihoasi UV-säteilyltä.

Lue lisää osoitteesta www.actinica.fi



Kasvot korvat mukaan lukien:


Vähintään kaksi pumpun painallusta

Hiukseton päänahka:

Vähintään yksi pumpun painallus

Kaula:

Vähintään yksi pumpun painallus



Rintakehä:

Vähintään yksi pumpun painallus

Käsivarsi kyynänpäästä alaspäin:

Vähintään kaksi pumpun painallusta

Kämmenselkä:

Vähintään yksi pumpun painallus

SPF 50+



*Potilaat, joiden immuunipuolustus on heikentynyt (elinsiirron saaneet)

**Actinica Lotion -voidetta voi ostaa
ihotautiklinikoilta, apteekeista ja verkkoapteekeista**

GALDERMA

Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Ruotsi
+46 18 444 03 30 www.galderma.fi